납 중독 안전을 위한 도움말

FIRST 5 CALIFORNIA

납중독의 위험

납중독 위험으로부터 아이를 보호하는 요령

여러분 집에 납 성분이 함유된 페인트가 없는지 확인하십시오.

납 성분이 함유된 페인트는 아이들에게 심각한 병을 유발할 수 있습니다.

납 성분 함유 페인트에 중독되는 경우 뇌 손상을 초래할 수 있습니다.

납 성분이 든 페인트는 오래된 집에서 발견됩니다. 납은 집 안팎에서 다 발견될 수 있습니다.

납성분 페인트가 사는 곳 주변에 있다고 생각하시면, 아이들의 혈액 검사를 해보십시오. 의사나 클리닉에 문의하십시오.

납은 또한 화장품이나 도자기류에서도 발견될 수 있습니다. 아이가 납성분에 노출되었다고 생각되면 클리닉에 데려가 납에 대한 특별 혈액검사를 하도록 하십시오.

아이가 한 살때 의사나 의료 종사자에게 납 중독에 대한 검사를 받게 하십시오.

의사는 혈액검사를 통해 중독 여부를알 수 있습니다.

납중독이 된 아이들의 대부분은 병에 걸린 것처럼 보이거나 행동하지 않습니다.

아이가 메디캘(Medi-Cal)이 있거나 아동 건강 및 장애 방지 프로그램(Child Health and Disability PreventionProgram: CHDP)에 가입되어 있는 경우 납중독 테스트는 무료입니다. 많은 의료 보험회사들도 이 검사비용을 지불해 줍니다.

납중독에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까?

납중독 핫라인으로 전화하십시오:

(800) 532-3394

©2003 First 5 California